


**KGSP**

认证公司



# Product List

追求美丽，尊重生命  
怀有爱情，保持安康





Biowellspharm

本公司产品



**BIO**  
Wellspharm  
(주)바이오웰스팜

BIO Wellspharm有限公司

# 局部麻醉霜



## Emmao Plus霜

[局部麻醉霜]

Emmao Plus Cream  
Local Anesthetics

分类 编码	一般 121	保险代码	不属于保险	包装单位	450 g
成分·含量	1g中含有96mg利多卡因				
功能·效果	减少男生生殖器的敏感性				
用法·容量	性交5~15分前涂抹0.24~0.65 g利多卡因(利多卡因23~62 mg) 容量和适用时间有所不同, 建议使用最低有效量 24效时内用药不得超过2g(利多卡因184mg)				



## Emmao 5%霜

[局部麻醉霜]

Emmao 5% Cream  
Local Anesthetics

分类 编码	专业 121	保险代码	不属于保险	包装单位	450 g
成分·含量	1g中含有25mg利多卡因、25mg丙胺卡因				
功能·效果	1.注射针头时或外科伤口处理时麻醉皮肤表面 2.麻醉生殖器粘膜表面(例如:去除湿疣前)				
用法·容量	1.皮肤 1) 注射针头时(例如:静脉插管、抽血)将2g本药品最少使用1小时、最多使用5小时 2) 外科小手术时【例如:去除软疣】,将1.5~2g/10cm <sup>2</sup> 的本药品至少使用一小时 3) 外科大手术时【例如:皮肤移植术】将1.5~2g/10cm <sup>2</sup> 的本药品至少使用2小时、最多使用5小时 2.生殖器粘膜 去除湿疣在处理部位上涂抹10g的本药品, 5~15分左右, 清除药品后立即动手术 *3~12个月婴儿: 总量不得超过2 g、适用范围不得超过16cm <sup>2</sup>				



## Regeness霜

【局部麻醉霜/出口用】

Regeness Cream  
Local Anesthetics

分类 编码	一般 121	保险代码	不属于保险	包装单位	500 g
成分·含量	1g中含有105.6mg利多卡因				
功能·效果	减少男生生殖器的敏感性				
用法·容量	性交5~15分前涂抹0.24~0.65 g利多卡因(利多卡因23~62 mg) 容量和适用时间有所不同, 建议使用最低有效量 24效时内用药不得超过2g(利多卡因184mg)				

# VITAMIN B1



## Haprokin 注射

[盐酸吡喃硫胺]

Haprokin Inj.  
Fursultiamine Hydrochloride

分类 编码	专业 312	保险代码	不属于保险	包装单位	10 ml x 10Amps.						
成分·含量	1 Amp (10 ml) 中含有5.46 mg/ml 盐酸吡喃硫胺										
功能·效果	<p>1.预防、治疗维生素B1缺乏症                  2.对维生素B1的需求增加, 饮食摄取不充分时供给 (消耗性疾病、甲状腺功能亢进症、孕妇、授乳妇、激烈的体力劳动后)                  3.韦尼克脑病(Wernicke encephalopathy)                  4.脚气性心脏病                  5.推定患者患有如下疾病导致的维生素B1缺乏或代谢疾病</p> <table border="0" style="width:100%; text-align:center;"> <tr> <td style="border-right: 1px dashed black;">1 神经痛</td> <td style="border-right: 1px dashed black;">2 肌肉痛、关节痛</td> <td style="border-right: 1px dashed black;">3 末梢神经炎 末梢神经麻痹</td> <td style="border-right: 1px dashed black;">4 心肌代谢障碍</td> <td style="border-right: 1px dashed black;">5 便秘等肠胃</td> <td>6 手术后肠管麻痹 运动功能障碍</td> </tr> </table> <p>推定维生素B1缺乏或代谢障碍, 但没有效果时 使用期间不能超过一个月</p>					1 神经痛	2 肌肉痛、关节痛	3 末梢神经炎 末梢神经麻痹	4 心肌代谢障碍	5 便秘等肠胃	6 手术后肠管麻痹 运动功能障碍
1 神经痛	2 肌肉痛、关节痛	3 末梢神经炎 末梢神经麻痹	4 心肌代谢障碍	5 便秘等肠胃	6 手术后肠管麻痹 运动功能障碍						
用法·容量	成人, 一天将5~100mg的盐酸吡喃硫胺注射到皮下、肌肉内或者静脉内 根据患者病状调整用量										

# VITAMIN D



## Bonmarin 注射

[胆钙化醇]

Bonmarin Inj.  
Vitamin D3

分类 编码	专业 311	保险代码	不属于保险	包装单位	1.5 ml x 10 Amps.
成分·含量	1 Amp (1.5 ml)中含有7.5mg / 1.5 ml (5 mg/ml) (300,000 IU)胆钙化醇				
功能·效果	<p>1.预防、治疗缺乏维生素D的老年人和青少年                  2.治疗缺乏维生素D的成人</p>				
用法·容量	<p>配方使用, 务必确认血液中25-羟基维生素D量后调整用量                  给药后成人在三个月、青少年在六个月以内务必确认治疗效果和抗药性                  根据上述结果决定是否继续给药过量使用会增加异常反映, 请勿超量给药</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 成人: 将200,000 IU的胆钙化醇注射到肌肉</li> <li>- 青少年: 将200,000 IU的胆钙化醇注射到肌肉</li> <li>- 老年人: 将 100,000 IU的胆钙化醇注射到肌肉</li> </ul> <p>年间给药量不得超过600, 000IU胆钙化醇</p>				

## 抗氧化



**谷胱甘肽注射 600 mg**  
[谷胱甘肽 / 圆形药丸]

**Gluthione Inj.**  
GLUTATHIONE (Reduced)

分类 编码	专业 399	保险代码	不属于保险	包装单位	10 Vials
成分·含量	谷胱甘肽(圆形药丸) 600mg				
功能·效果	预防顺式铂氨或类似化学疗法导致的神经性疾病				
用法·容量	病状严重:一天将600-1200mg肌肉注射或静脉输液注射 数日治疗或病状轻:一天将300-600mg肌肉注射或静脉输液注射				

## O T H E R S



**丙帕他莫**  
[乙酰氨基酚 1000 mg]

**Acetamol Inj.**  
ACETAMINOPHEN 1000 mg / 100 ml

分类 编码	专业 114	保险代码	不属于保险	包装单位	100 ml x 20包
成分·含量	乙酰氨基酚 1000 mg / 100 ml				
功能·效果	由于痛症或高烧需要迅速静脉注射或无法使用其他竖着方法时 1.严重痛症(手术后)的短时间治疗 2.短时间治疗发烧				
用法·容量	静脉注射,限于成人、体重33kg(大约11岁)以上儿童 提供给50kg以上成人 一天四次,一次提供1000mg乙酰氨基酚,最少注射时隔4小时 一天最多容量不得超过4g 体重33kg(大约11岁)以上儿童、体重未滿50kg成人 一次15 mg/kg(大约1.5 ml/kg)乙酰氨基酚,最少十个4小时注射 一天最多提供量不得超过60 mg/kg或4g 严重肾障碍患者 严重肾障碍患者(肌酸酐清除率≤30 ml/min)注射时隔最少6小时 注射方法:本药品采用15分静脉注射方式				

## 其他类产品

### Ldirase注射/LDL注射

[透明质酸酶]



### Ldirase Inj. / LDL Inj.

Hyaluronidase 1500 IU



Ldirase注射和LDL注射  
实物大小不同

分类 编码	专业 395	保险代码	不属于保险	包装单位	10 Vials
成分·含量	1 Vial 中含有 1,500 IU 透明质酸酶				
功能·效果	皮下注射、肌肉注射；局部麻醉剂或皮下注射时提高渗透力 促进组织内过多存在的体液和血液的再吸收				
用法·容量	<p>成人、儿童及老年人</p> <p>1.皮下注射时(大量皮下注射)</p> <p>皮下注射前将1,500 IU透明质酸酶融化在注射用水或生理盐注射液1ml后注射到该部位，或者注射时将将在注射针的2cm上端管子中注射 输液500~1,000ml时适合使用1,500IU的本药品； 向儿童和老年人输液时应适当调整速度和总量，请注意肾患者体内水分过度现象</p> <p>2.皮下注射或肌肉注射时</p> <p>将1,500IU的本药品直接融化到注射液中直接使用</p> <p>3.局部麻醉剂</p> <p>将1,500IU的本药品直接融化到局部麻醉剂注射液中直接使用 在眼科使用时建议每ml使用15IU</p> <p>4.血管外流</p> <p>不是局部，而是开始扩散时，尽快将1,500IU的本药品融化1ml的注射用水或生理盐注射液中，浸润到病变部位中</p> <p>5.血肿</p> <p>将1,500IU的本药品融化1ml的注射用水或生理盐注射液中，浸润到该部位 使用前将本药品和1ml的注射用水融化到注射液中 皮下注射注射液应与体内脑细胞外液等渗 本药品可以与常用输液剂调配 据报告，大量皮下注射中与生理盐注射液、0.18%氯化钠、4%葡萄糖、0.45%氯化钠、2.5%葡萄糖、5%葡萄糖一起用过。 钾应注射到等渗葡萄糖或生理盐注射液中，其量为34 mmol/L 更适合使用含有电解质的输液剂，注射速度不能过快 本药品可以与吗啡、二乙酰吗啡、氢吗啡酮、氯丙嗪、甲氧氯普胺、丙嗪、地塞米松、局部麻醉剂及肾上腺素混合使用</p>				



### LDL药片

[褐藻酸、羧甲基纤维素]

### LDL Tab.

Alginate acid &  
Carboxymethylcellulose Sodium

分类 编码	专业 399	保险代码	不属于保险	包装单位	300 T.
成分·含量	1粒药片中含有200mg褐藻酸、100mg 羧甲基纤维素				
功能·效果	减少饮食摄取，辅助减肥				
用法·容量	一次2粒，一天三次，饭前服用，需要时睡前附加服用2粒 服用时保持充足水分建议服用推荐用量，至少3-4周				

分类编码	产品	产品名称	包装单位	主要成分	功能·效果	备注
维生素						
312. 专业 不属于保险		Haprokin 注射	10A	1 安瓶(10 ml) 中 含有 54.6 mg 盐酸吡哆醇	预防、治疗维生素B1缺乏症	维生素B1 (大蒜素注射)
312. 专业 不属于保险		大蒜注射	10A/ 50A			
311. 专业 不属于保险		Bonmarin 注射	10A	1 安瓶(1.5 ml) 中 含有 7.5 mg 胆钙化醇 (300,000 IU)	预防、治疗缺乏维生素D的老年人、青少年、 成人	
311. 专业 不属于保险		维他命注射	5A	1 安瓶(1 ml) 中 含有 5 mg 胆钙化醇 (200,000 IU)	预防、治疗缺乏维生素D的老年人、青少年、 成人	维生素D3
311. 专业 不属于保险		BM Hi-D 注射	10V			
311. 专业 不属于保险		VitaBella 注射	10PF			
316. 专业 不属于保险		Multivita 注射	10V	1 小瓶中 维生素 A 维生素 B群 维生素 C 维生素 D 维生素 E	1.如何保持通过输液剂获取营养的 患者体内维生素 2.如下患者的维生素(维生素K除外) 预防缺乏:外科手术、严重烧伤 骨折剂其他外伤、严重感染病 昏迷状态	多种 维生素注射
316. 专业 不属于保险		S多种维生素 注射				
314. 专业 不属于保险		维生素C注射	20 mL x 10V	1 小瓶 (20 ml) 中 含有 10g 抗坏血酸	预防、治疗维生素C缺乏	高容量 维生素C
314. 专业 不属于保险		Ascovic 注射				
314. 专业 不属于保险		Vi-C UP 注射				
313. 专业 不属于保险		Ribovita注射	1 ml x 50A	核黄素 12.71 mg/ml	预防、治疗维生素B2缺乏症	维生素B2
239 专业 不属于保险		HighB5注射	50A	D-泛酰醇 250 mg/ml	预防、治疗泛酸缺乏症	维生素B5
313. 专业 不属于保险		Vitamo注射				
313. 专业 不属于保险		HighB6注射	50A	吡哆醇 50 mg/ml	预防、治疗维生素B6缺乏症	维生素B6
313. 专业 不属于保险		吡哆醇注射				
312. 专业 不属于保险		Pan-B-Comp 注射	4 ml x 10A	盐酸硫胺、核黄素、 烟酸、D-泛醇、吡哆醇 生物素、氰钴胺素	提供维生素B群	维生素 B-complex

分类编码	产品	产品名称	包装单位	主要成分	功能·效果	备注
维生素						
114. 专业 不属于保险		Hycomin 注射				
114. 专业 不属于保险		Ledup注射	2 ml x 50A	1安瓶(2 ml) 中 含有 5 mg 盐酸羟钴胺	急性神经炎、多发性神经炎、坐骨神经痛 风湿性关节炎、颈肩腕综合征、神经根痛 肩关节炎、癌病以及外伤导致的神经痛 带状疱疹及偏头痛导致的神经痛	维生素B12
114. 专业 不属于保险		Hycobal注射				
胎盘						
326. 专业 不属于保险		Lainec注射	2 ml x 50A	1安瓶(2 ml) 中 含有2ml紫河车水解产物	改善慢性肝病者的肝功能	
325. 专业 不属于保险		Melsmon注射 MELSMON注射	2 ml x 50A	1安瓶(2 ml) 中 含有2ml紫河车提取物	改善更年期障碍病状	胎盘注射
325. 专业 不属于保险		Rejuve注射	50A			
抗氧化剂						
399. 专业 不属于保险		谷胱甘肽 600mg	10V	1小瓶中 谷胱甘肽(圆形药丸) 600mg	预防顺铂或者类似系列 化学疗法导致的神经性疾病	医院
399. 专业 不属于保险		Ditoxion注射 1200mg	10V	1小瓶中 含有1200mg谷胱甘肽(圆形药丸)		
399. 专业 属于保险		硫辛酸注射	24 ml x 5A	Thioctic Acid Tromethamine 39.7 mg/ml (保险代码:642200991 4,866/A)	缓解糖尿病导致的多发神经病	
399. 专业 不属于保险		I-della 注射	10A	1安瓶(5 ml) 中 含有 25 mg 硫辛酸	对硫辛酸的需求增加时给药 (激烈的体力劳动后) Leigh氏脑病(亚急性坏死性脑病) 中毒性(链霉素、卡那霉素)导致的 噪音性(职业性)迷路性聋	灰姑娘 注射
399. 专业 不属于保险		Cindella注射				
局部麻醉剂						
121. 一般 不属于保险		Emmao Plus 霜	450 g	1g中 含有 96 mg 利多卡因	减少男生生殖器的敏感性	麻醉霜
121. 一般 不属于保险		利多卡因霜	30 g			
121. 一般 不属于保险		Dermacan霜	500 g			
121. 专业 不属于保险		Emmao 5% 面霜	450 g	1.注射针头或进行表面上的 外科伤口处理时麻醉皮肤表面 2.麻醉生殖器粘膜表面(例如:去除湿疣前)		
121. 一般 不属于保险		Regeness霜 (出口用)	500 g	1g中 含有 105.6 mg 利多卡因	减少男生生殖器敏感性	



分类编码	产品	产品名称	包装单位	主要成分	功能·效果	备注
矿物质						
339. 专业 不属于保险		Multiblue 5 注射	10 ml x 25V	1 小瓶 (10 ml) 中 含有200 µg硒、 10 mg 锌、4 mg铜、 1 mg锰、40 µg 铬	向颈静脉提供营养时提供 微量元素 (锌、铜、锰、硒、铬)	必要 矿物
339. 专业 不属于保险		Jeil Mineral5 注射	10 ml x 10V			
124. 专业 不属于保险		Masi注射 10%	5 ml x 25A	七水硫酸镁 0.1 g/ml	痉挛、发作、防止子宫僵硬 提供电解质	镁 注射(Mg)
322. 专业 不属于保险		Selinu 注射	10 ml x 10V	1 小瓶 (10 ml) 中 含有400 µg硒	非口服营养疗法 (TPN) 时补充硒	硒 注射(Se)
322. 专业 不属于保险		Selenewmin 注射				
322. 专业 不属于保险		Zinc-in注射	10 ml x 10V 20 ml x 10V	1 小瓶中含有 1 mg/ml 锌	非口服营养疗法 (TPN) 时补充锌	锌(Zn) 注射
322. 专业 不属于保险		Zincon注射	10 ml x 10V			
氨基酸						
325. 专业 不属于保险		Nutri Hex 注射	100 ml x 20EA 250 ml x 10EA	L-色氨酸、L-组氨酸、L-异亮氨酸、 精氨酸、甘氨酸、丙氨酸、L-脯氨酸、 L-蛋氨酸、L-苏氨酸、L-苯丙氨酸、 L-缬氨酸、L-亮氨酸等	氨基酸输液剂 (静脉注射的基础营养剂)	氨基酸 输液
325. 专业 不属于保险		Winuf Peri 注射	362 ml	L-亮氨酸 7.3 g、L-赖氨酸盐酸盐 7.25 g 外	针对无法通过口服或肠胃摄取营养 或者摄取不足、禁止摄取等原因 而通过颈静脉获得营养的患者 提供水分、电解质、氨基酸、卡路里、 必要脂肪酸、欧米茄-3脂肪酸时	3-chamber
325. 专业 不属于保险		Vita-sol注射	250 ml x 10ea	L-异亮氨酸、L-亮氨酸、木糖醇、 L-赖氨酸盐酸盐、核黄素磷酸钠、钠、 吡哆醇、烟酰胺、肌醇外	氨基酸输液剂 (静脉注射的基础营养剂) 先天性尿素循环异常、 赖氨酸尿性蛋白不耐症	氨基酸输液
399. 专业 不属于保险		大韩 L-精氨酸	100 ml x 10 Bottle 150 ml x 10 Bottle	1 瓶中 含有 100 mg/ml L-精氨酸	提供谷氨酰胺	精氨酸注射
325. 专业 不属于保险		Dipeptiven 注射	50 ml x 10병	N(2)-L-丙氨酸-L-谷氨酰胺	治疗皮肤移植导致的伤口 并收复组织	谷氨酰胺
PDRN						
325. 专业 不属于保险		Placentex注射	3 ml x 5A	1 安瓶 (3 ml) 中 含有多聚脱氧核苷酸 5.625 mg	对成人及3岁以上儿童进行 全身麻醉并保持麻醉状态 镇静人工呼吸中的重病患者 手术及诊断时的镇静	三文鱼注射 (PDRN)
325. 专业 不属于保险		HiDr注射	3 ml x 10V			
全身麻醉剂						
111. 专业 属于保险		名门 Provive注射 1%	10 ml x 10V 20 ml x 5V 50 ml x 1V	丙泊酚 10 mg/ml (保险代码: 10 ml (保险代码: 20 ml (保险代码: 50 ml	对成人及3岁以上儿童进行 全身麻醉并保持麻醉状态 镇静人工呼吸中的重病患者 手术及诊断时的镇静	全身麻醉剂
111. 专业 属于保险		东国 丙泊酚注射	8 ml x 10A 12 ml x 5A 20 ml x 5A	丙泊酚 10 mg/ml (保险代码: 8 ml (保险代码: 12 ml (保险代码: 20 ml		

分类编码	产品	产品名称	包装单位	主要成分	功能·效果	备注
生长激素						
241. 专业 不属于保险		CARELTROPIN 注射	1.5 ml x 4EA	1 小瓶(1.5 ml) 中 含有 75 mg (22.5 IU) 生长激素	通过Two dynamic test确认, 对缺乏生长激素的成人 代替生长激素	成人 生长激素
其他						
395. 专业 不属于保险		Ldirase注射	10V	1 小瓶中 含有 1,500 IU	皮下注射、肌肉注射、局部麻醉剂以及 皮下注射时增加渗透力, 促进组织内 过多的体液剂血液的再吸收	痛疼(浮肿) 管理去除填充物
395. 专业 不属于保险		LDL注射	10V			
395. 专业 不属于保险		Liporase注射	10V			
219. 专业 不属于保险		Fatless注射	25A	1 安瓶(5 ml) 中 含有1g左旋肉毒碱	治疗一次性、二次型左旋肉毒碱缺乏症、 狭心症、急性心肌梗塞、血透中 肾脏患者的左旋肉毒碱缺乏症	左旋肉毒碱 注射
219. 专业 不属于保险		Cartine注射	10A			
399. 专业 不属于保险		ATP注射	2 ml x 50A	1 安瓶 (2 ml) 中 含有Adenosine Triphosphate Disodium Trihydrate 21.961 mg	改善筋无力症、心衰竭、慢性肝炎中的 肝功能, 头部外伤后遗症、 调节性眼疲劳	核酸注射
392. 专业 不属于保险		Glucolin S 注射	20 ml x 50A	1 安瓶 (20 ml) 中 含有 20 mg L-半胱氨酸盐酸盐、 53 mg 甘草酸二钾、 400 mg 氨基乙酸	痞廬、湿疹等过敏性皮肤疾病 药物中毒的辅助里哦发、改善慢性疾病的 肝功能	甘草注射
399. 专业 不属于保险		Same注射	5V	S-腺苷基蛋氨酸、 192 mg L-蛋氨酸	忧郁症	S-Adenyl- l-Methionine
429. 专业 不属于保险		Immu-alpha 注射	2V	1 1.6 mg Thymosin Alpha	对免疫力降低的高龄患者 接种流感疫苗时的辅助疗法	免疫注射
399. 专业 不属于保险		Hiront注射	10管	10 mg/ml 透明质酸	膝关节病、肩周炎	水光针
119. 专业 不属于保险		S-Choline注射	10A	250 mg/ml 氯化胆碱	脑血管 缺损导致的2次病状和变形 或者退行性脑基质性精神综合症	改善脑功能
219. 专业 不属于保险		Mezzo fyline 注射	10A	含有 20 mg 己酮可可碱	脑循环障碍 眼睛血液循环专干 末梢动脉循环障碍	末梢血管扩张 脑功能改善剂
219. 专业 不属于保险		Ginkgo 注射	5 ml x 25A	1 安瓶 (5 ml) 中 含有 17.5 mg 银杏精华	智力、警觉能力降低、发昏、耳鸣、头痛、 视力障碍、记忆减退、不安、忧郁感、 迷路性聋、血管性代谢性、颈部病状导致的 听力、语言能力下降等	银杏精华
114. 专业 不属于保险		Nefopen注射	20A	1 安瓶(2 ml) 中 含有 20 mg Nefopam HC	对急性痛症的对症疗法 尤其是手术后的痛症	痛症注射
399. 一般 不属于保险		LDL药片	300T	1粒药片中 含有200 mg褐藻酸、100mg 羧甲基纤维素	减少饮食摄取, 辅助减肥 的疗法	减肥 辅助剂